

Információ páciensek számára THARROS

A THARROS vizsgálat olyan **krónikus obstruktív tüdőbetegségben** szenvedő pácienseknek nyújthat lehetőséget, akiknél emellett **fennáll a szívproblémák kockázata:**

- ✓ 40-80 év közöttiek
- ✓ Igazolt COPD
- ✓ Jelenlegi vagy korábbi dohányos (legalább 10 csomagévnnyi)
- ✓ Az alábbi 4 feltétel közül legalább 1 teljesül:
 - Igazolt szív- és érrendszeri betegség (szívinfarktus, koszorúér műtét, angina pectoris, szívelégtelenség, coronariastenosis, perifériás artériás érbetegség)
 - Az alábbi kardiovaszkuláris kockázati tényezők közül legalább 3 fennállása:
 - Dokumentált magasvérnyomás (140/90 Hgmm)
 - Dokumentált cukorbetegség
 - Krónikus vesebetegség
 - Magas koleszterin
 - Elhízás: testtömegindex (BMI) ≥ 30 kg/m²
 - Magas a szív- és érrendszeri megbetegedés kockázata, esemény nélkül (pl. szívinfarktus, stroke, szívelégtelenség)
 - Korábban végzett CT-vizsgálat alapján igazolt koszorúér-meszesedés:
 - Mérsékelt vagy súlyos meszesedés
- ✓ A résztvevő hajlandó, és az orvos megítélése szerint képes a jelenlegi COPD-kezelését módosítani a vizsgálati protokoll előírásai szerint

A vizsgálatba NEM vonhatóak be azok a betegek, akiknél:

- ✗ Aktív asztma diagnózis az elmúlt 5 évben, vagy bármely más krónikus légzőszervi betegség, például aktív tuberkulózis, tüdőfibrozis, szarkoidózis, intersticiális tüdőbetegség, illetve pulmonális hipertónia
- ✗ Végstádiumú vesebetegség, amely vesepótló terápiát igényel
- ✗ Szív- vagy tüdőtranszplantáció a kórelőzményben
- ✗ Beültetett bal kamrai segédeszköz, vagy a beültetés várhatóan < 3 hónapon belül esedékes
- ✗ Tüdőtumor a kórelőzményben (elmúlt 5 évben)
- ✗ Instabil vagy életveszélyes szívbetegség – az 1. vizitnél az alábbiak bármelyike kizárást jelent:
 - Szívinfarktus vagy instabil angina az elmúlt 8 hétben
 - Instabil vagy életveszélyes szívritmuszavar, amely beavatkozást igényelt az elmúlt 8 hétben
- ✗ Tüdőgyulladás és/vagy középsúlyos vagy súlyos COPD, amely nem rendeződött legalább 8 héttel az 1. vizit előtt
- ✗ Bármely életveszélyes állapot, beleértve a rosszindulatú daganatokat is, amely < 5 éves várható élettartammal jár
- ✗ Fenntartó inhalációs szteroid kezelés alkalmazása az elmúlt 12 hónapban
- ✗ Részvétel másik klinikai vizsgálatban, ahol gyógyszert alkalmaztak 30 napon belül
- ✗ Ismert túlérzékenység vagy allergia a gyógyszer hatóanyagára, vagy az inhalátor bármelyik összetevőjére
- ✗ Csak nőkre vonatkozóan – jelenleg terhes (pozitív terhességi teszttel igazolva) vagy szoptat

**Ha úgy gondolja, hogy megfelelhet ezen feltételeknek,
és érdeklődik a vizsgálatban való részvétel iránt,
kérjük, jelentkezzen az alábbi telefonszámon:**